

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Rue Saint-Jean • BP 19 • 31130 BALMA Tél. (61) 24,06,51 PUBLICATION PÉRIODIQUE Abonnement annuel: 92 F Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne CCP: 8612-11 R Toulouse

BULLETIN Nº 17 DU 6 DECEMBRE 1984

CEREALES

Intervenir contre les pucerons dans les parcelles non traitées

JAUNISSE NANISANTE DE L'ORGE

* Stades phénologiques

- 3-4 feuilles à début tallage pour les semis d'octobre.
- 1 à 2 feuilles pour les semis postérieurs au 5 novembre.

Situation

Aucune recolonisation à ce jour par les pucerons dans les parcelles précoces (semis d'octobre) déjà traitées.

Infestation quasi générale dans les parcelles semées plus tardivement (à compter du 05/11), encore non traitées.

Préconisations

Semis d'octobre

Surveiller les parcelles traitées depuis plus de 3 semaines pour une intervention eventuelle si le seuil de 10 % de plantes présentant des pucerons est dépassé.

Semis de novembre

Intervenir sur toute culture ayant atteint le stade 2 feuilles dès que la présence de pucerons est notée sur au moins 10 % des plantes.

Utiliser l'un des insecticides suivants :

Matière active	Spécialité - Concentration		Firme	Dose
bromophos	NEXION EC 40	360 g/l	SOVILO	l I/ha
ототторноз	SOVI NEXION 25 EM émulsion	250 g/l	SOVILO	1,5 l/ha
cyperméthrine	CYMBUSH	100 g/I	SOPRA	0,2 I/ha
	KAFIL SUPER	100 g/l	LA QUINOLEINE	0,2 I/ha
	SHERPA 10	100 g/l	RHONE-POULENC	0,2 I/ha
deltaméthrine	DECIS	25 g/l	PROCIDA	0,3 l/ha
fenvalérate	SUMICIDIN 10	100 g/I	AGRISHELL	0,25 I/ha

722